

# Notice pour le nettoyage annuel des nichoirs

## Informations générales

Le nettoyage des nichoirs peut se faire **entre octobre et février**. Il est important de bien s'assurer que le nichoir n'est pas utilisé par des occupants tardifs (chauves-souris, gliridés tels que loir, lérot, muscardin). Si c'est le cas, laisser le nichoir en place sans le nettoyer pour cette fois.

Lors de l'ouverture des nichoirs, attention à la présence potentielle de nids de guêpes ou de frelons à l'intérieur.

Il est également possible de retrouver des cadavres d'oisillons ou d'oiseaux à l'intérieur des nichoirs.

## Matériel nécessaire

- Echelle/nacelle
- Pince, visseuse ou autre moyen de décrocher les nichoirs
- Gants
- Masque pour la poussière
- Brosse pour la vaisselle (+ éventuellement vinaigre de nettoyage)
- Tournevis plat ou spatule de plâtrier pour frotter les angles
- Eventuellement un chalumeau



*Brosse convenant bien au nettoyage des nichoirs*

## Infos pratiques

Il est recommandé de porter des gants pour le nettoyage des nichoirs. Les personnes sensibles à la poussière ou aux acariens devraient de surcroît porter un masque ou faire faire le nettoyage à quelqu'un d'autre...

Pour des questions de sécurité, il est recommandé de descendre les nichoirs et de les nettoyer au sol pour éviter toute chute en travaillant en haut de l'échelle.

## Informations par espèces

### Hirondelle de fenêtre

1. Détacher les nidoirs.
2. Vider tout le contenu apporté par d'autres espèces (les hirondelles n'apportent que très peu de matériel à l'intérieur des nids).
3. Frotter à l'aide d'une brosse pour enlever les parasites présents dans le nichoir ou sur le support en bois. Eventuellement tremper la brosse dans du vinaigre blanc pour ses propriétés désinfectantes, bien laisser sécher le cas échéant. L'utilisation d'un petit chalumeau est aussi possible pour éliminer les parasites.
4. Remettre le nichoir en place.



*Matériel apporté par des moineaux domestiques dans un nichoir à hirondelle de fenêtre*



*La quantité de parasite est parfois impressionnante (ici sur la plaquette d'un nichoir d'hirondelle de fenêtre)*

### Remarques :

- Les nichoirs trop endommagés (coque fissurée, support en bois partiellement décollé) doivent être changés pour éviter toute chute du nichoir lors de la prochaine nidification.
- Si les hirondelles ont construit des compléments au nichoir artificiel (p.ex. pour rétrécir le trou du nichoir), laissez-les en place.



*Adaptation de la taille du trou de sortie faite par les hirondelles*

## Martinet noir :

1. Ouvrir le nichoir et vider tout le matériel (paille, foin, plumes etc.) apporté par d'autres espèces **en veillant à laisser en place la « petite coupelle rigide »** façonnée par les martinets eux-mêmes. Cette petite structure est utilisée pour y déposer les œufs et sera réutilisée au fil des années.



*Matériaux accumulés par des Moineaux friquets au cours d'une seule saison de nidification dans un nichoir à martinets. En l'état, le nichoir n'est plus utilisable pour le Martinet noir.*

2. Frotter délicatement les parois et les angles du nichoir à l'aide d'une brosse pour enlever les parasites présents dans le nichoir. Eventuellement tremper la brosse dans du vinaigre blanc pour ses propriétés désinfectantes, bien laisser sécher le cas échéant. L'utilisation d'un petit chalumeau est aussi possible pour éliminer les parasites.
3. Vérifier l'état général du nichoir (revisser les vis si besoin, etc.)

## Remarque :

Certains nichoirs (notamment ceux vendus par [la Station ornithologique suisse](#)) offrent la possibilité de fermer l'ouverture durant l'hiver. Cela permet d'éviter que les moineaux l'utilisent avant l'arrivée tardive des martinets noirs vers la fin du mois d'avril. On évite ainsi que les martinets délogent les moineaux en cours de nidification. Ne pas oublier d'ouvrir la porte avant l'arrivée des martinets.



*Coupelle réalisée par le martinet*

Autres passereaux (mésanges, gobemouches, sitelles, etc.)

1. Décrocher le nichoir
2. Vider le matériel accumulé pour la construction du nid. Même si cela semble dommage pour le nid, les occupants vont de toute façon en construire un nouveau par-dessus l'ancien lors de la prochaine saison de nidification. Laisser le vieux nid augmente la charge parasitaire ainsi que le risque de chute précoce des oisillons si le fond du nid est trop proche du trou de sortie. Profiter d'observer la belle structure du nid construit de brindilles. C'est un travail impressionnant que réalisent chaque années ces nicheurs en cavités.



*Le matériel accumulé augmente le risque de chute des oisillons et les parasites dans le nid. Le tout peut être enlevé.*

3. Frotter délicatement à l'aide d'une brosse pour enlever les parasites présents dans le nichoir ou sur le support en bois. Eventuellement tremper la brosse dans du vinaigre blanc pour ses propriétés désinfectantes, bien laisser sécher le cas échéant. L'utilisation d'un petit chalumeau est aussi possible pour éliminer les parasites.
4. Profiter de vérifier l'état général du nichoir et son étanchéité (resserrer les vis). Si besoin, remplacer les nichoirs trop anciens.

Documentation complémentaire :

<https://www.ornithomedia.com/pratique/conseils/octobre-bon-mois-pour-nettoyer-nichoires-02536/>

<https://www.vogelwarte.ch/modx/fr/oiseaux/conseils/nichoires/nichoires-pour-cavernicoles>